

## La caries infantil

Un tercio de los menores de 6 años presenta caries, lo que representa unos 850.000 niños y niñas afectados que acumulan cerca de 4 millones de dientes temporales con caries. De cada 4 dientes primarios con lesión de caries, solamente uno ha recibido el tratamiento oportuno.

El **35%** de los menores de 6 años tiene caries



Cerca de **850.000** menores

**3,7 millones** de dientes temporales afectados



El **73%** de los dientes temporales con caries está sin tratar

## La caries en adolescentes

Un tercio de los adolescentes presenta caries, lo que representa 1,3 millones de jóvenes que acumulan 2,4 millones de dientes permanentes afectados. De ellos, el 30% no ha recibido tratamiento.

El **30-35%** de los adolescentes (11-17 años) tiene caries



**2.400.000**  
dientes permanen-  
tes afectados

El **30%** de los dientes permanentes con caries está sin tratar

Media de dientes con caries: **0,6** a los 12 años. **0,9** a los 15 años

## La caries en el adulto joven (35-44 años)

El 94% de los adultos jóvenes en España presenta caries, lo que representa unos 11 millones de sujetos de entre 30-50 años de edad. Cada adulto joven tiene, en promedio, 7 dientes afectados por la caries. De ellos, el 40% se encuentra sin tratar.

94% de adultos jóvenes españoles presenta caries



11 millones

Cada adulto presenta, de media, **7 dientes** afectados por la caries

37%

**4/10** dientes afectados por la caries están sin tratar

## La caries en el adulto mayor (65-74 años)

A estas edades, la totalidad de la población ha sufrido caries en algún momento de su vida. Representa una afectación de 6,4 millones de personas comprendidas entre los 65-80 años de edad, cada una de ellas con un promedio de 15 dientes afectados. Solo 2 de cada 10 dientes han recibido su tratamiento dental. El 7% de los adultos mayores es edéntulo total.

**100%** de adultos mayores españoles presenta caries



**6,4 millones**

Cada adulto mayor presenta, de media, **15 dientes** afectados por la caries

**7%**

**de adultos** de más de 65 años son desdentados totales

**78%**

**8/10** dientes afectados por la caries están sin tratar

## La enfermedad periodontal en el adulto joven (35-44 años)

La enfermedad periodontal afecta al 25,5% de los adultos jóvenes en la actualidad, lo que supone unos 3 millones de adultos entre 30-50 años. De ellos, el 8% presenta la forma severa de periodontitis (con bolsas periodontales superiores a los 6 milímetros).

Afecta al 9,6% de los hombres y al 6,3% de las mujeres.

**1/4** de adultos jóvenes españoles presenta enfermedad periodontal



Cerca de **3 millones** de jóvenes adultos están afectados

El **8%** presenta forma severa de patología periodontal



## La enfermedad periodontal en el adulto mayor (65-74 años)

Un tercio de los adultos mayores está afectado por la enfermedad periodontal, lo que representa unos 2,2 millones de adultos de entre 65-80 años. De ellos, cerca del 12% presenta la forma severa de periodontitis (con bolsas periodontales superiores a los 6 milímetros). Se aprecia una clara asociación de la forma severa con el género: 17,3% de los hombres y 7,1 % de las mujeres.

El **35%** de los adultos mayores españoles presenta enfermedad periodontal

**2,2 millones**



El **12%** presenta forma severa de patología periodontal

## Perfil de la pérdida dentaria en el adulto mayor



**45%** Es la prevalencia de dentición funcional en el adulto mayor

**11** es el promedio de dientes ausentes en los adultos mayores

**7,3%** Es la prevalencia de edéntulos totales en adultos mayores

## EL CÁNCER ORAL EN ESPAÑA

### Los datos

**8.000**

casos de cáncer oral son diagnosticados en España cada año.

**75%**

de los casos de cáncer oral son diagnosticados de manera tardía.

**1.500**

fallecidos en España anualmente.

**50%**

han fallecido transcurridos 5 años.

**500**

más que los producidos por accidentes de tráfico.

**90%**

de supervivencia si se diagnostica precozmente.



## LAS MALOCLUSIONES EN ESPAÑA

### Las cifras

En España, los datos revelan que uno de cada cuatro adolescentes presenta maloclusión moderada o severa susceptible de ser corregida. En la adolescencia temprana, el 38% de los que lo necesita ha recibido su tratamiento ortodóncico, elevándose al 48% en la adolescencia intermedia.



## LAS CIFRAS EN ESPAÑA


En torno al 11% de la población adulta refiere algún síntoma compatible con la alteración de la ATM (2 millones de adultos). El signo más común es el chasquido en la articulación (20%), seguido del dolor a la palpación (10%). Se encuentra movilidad reducida en el 0,5% de los adultos jóvenes y en el 3,6% de los adultos mayores.



La evolución en adultos jóvenes: 2000-2020

## INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA


La salud oral influye en la calidad de vida a través del dolor dental, las limitaciones funcionales y el impacto sobre las relaciones sociales.




De los adultos tiene dolor dental con frecuencia.



De los adultos ha tenido problemas para masticar en el último año.



De los adultos ha tenido problemas de relaciones sociales en el último año.



De manera global, el 59% de la población percibe su estado de salud bucodental como bueno o muy bueno.